

Un filtre présent dans de nombreuses crèmes solaires se transforme en un composé cancérigène

Publié le 08.03.21 | Par [Claire Vilain](#)

Filtre organique de protection solaire fréquemment utilisé dans l'élaboration des écrans solaires et crèmes anti-âge, l'octocrylène se dégrade au sein même des flacons en un composé connu, cancérigène et perturbateur endocrinien : la benzophénone.

L'octocrylène est un filtre solaire organique utilisé dans les crèmes solaires. Ce filtre absorbe majoritairement les rayonnements UVB, principaux responsables du bronzage mais aussi des coups de soleil et des cancers de la peau. Des chercheurs du Laboratoire de biodiversité et biotechnologies microbiennes de l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer (Sorbonne Université/CNRS), en collaboration avec des confrères américains, ont mis en évidence le fait qu'une réaction de rétro-condensation aldolique transforme l'octocrylène en benzophénone, composé cancérigène et perturbateur endocrinien. *In vivo*, jusqu'à 70% de la benzophénone ainsi générée dans ces crèmes solaires pourrait être absorbée par la peau. Ce résultat a été publié dans la revue *Chemical Research in Toxicology* le 8 mars 2021.




Figure 1 - Transformation de l'octocrylène en benzophénone

Auteur(s)/Autrice(s) : C. A. Downs*, Joseph C. DiNardo, Didier Stien, Alice M. S. Rodrigues et Philippe Lebaron Source : [Chemical Research in Toxicology](#)

[Pour consulter le communiqué de presse du CNRS](#)

Pour consulter l'article [Benzophenone Accumulates over Time from the Degradation of Octocrylene in Commercial Sunscreen Products](#) publié dans la revue *Chemical Research in Toxicology*, le 8 mars 2021

CRÉDITS

AUTEUR(S)/AUTRICE(S)

[Claire Vilain](#)

Responsable éditoriale de CultureSciences-Chimie



CNRS